



Hunds-Rose (*Rosa canina* L.)

Standort: eher trocken, sonnig
 Blütezeit: 6
 Höhe: 3 Meter
 Die am schnellsten wachsende Wildrose
 Bienenweide, Vogelnahrung
 Hagebutten essbar, farbige „Winterdekoration“

Weitere Wildrosenarten:

Filzige Rose (*Rosa tomentosa*), **Feld-Rose** (*Rosa arvensis*) u.a.



Rote Heckenkirsche

(*Lonicera xylosteum*)
 Standort: halbschattig
 Blütezeit: 4-5
 Höhe: 2 Meter
 Nektarreiche Blüten, Raupenfutter (z.B. Kleiner Eisvogel), Vogelnahrung, Beeren paarweise verwachsen, giftig



Purgier-Kreuzdorn

(*Rhamnus cathartica*)
 Standort: eher trocken, sonnig bis halbschattig
 Blütezeit: 5
 Höhe: 3 Meter, langsam wachsend
 Hat nektarreiche Blüten, dient als Nistgehölz und Vogelnahrung, giftig



Felsenmispel / Felsenbirne

(*Amelanchier ovalis*)
 Standort: sonnig, erträgt Trockenheit gut, ist Felspflanze
 Blütezeit: 4-5
 Höhe: bis 3 Meter
 Nahrung für Insekten und Vögel, Blätter mit schöner Herbstfärbung, Beeren essbar



Stechpalme (*Ilex aquifolium*)

Standort: eher feucht, schattig bis halbschattig
 Blütezeit: 5
 Höhe: 5+, sehr langsam wachsend, zweihäusig, immergrün
 Bienenweide, nach den ersten Frösten Vogelnahrung
 stark giftig



Gemeine Berberitze
(*Berberis vulgaris*)

Standort: sonnig bis halbschattig, eher trocken
Blütezeit: 5-6
Höhe: bis 3 Meter, langsam wachsend
Früchte essbar



Kornelkirsche (*Cornus mas*)
„Tierlibaum“

Standort: sonnig bis halbschattig
Blütezeit: 3
Höhe: bis 5 Meter, langsam wachsend
Bienenweide, Nahrung für Vögel und Kleinsäuger
Früchte essbar



Schwarzdorn (*Prunus spinosa*)

Standort: sonnig
Blütezeit: 4
Höhe: 3 Meter, langsam- aber dichtwüchsig
Bienenweide, Raupennahrung, ideales Gehölz für Brutvögel
Früchte essbar



Gemeiner Liguster
(*Ligustrum vulgare*)

Standort: halbschattig bis sonnig, erträgt Trockenheit gut
Blütezeit: 5-7
Höhe: 4 Meter, gut geeignet für Schnitthecke, Blätter lange grün, Bienenweide, Schmetterlinge (Nektar, Raupennahrung), Deckung für Vögel, Beeren giftig



Hartriegel (*Cornus sanguinea subsp. sanguinea*)

Standort: wächst fast überall,
Blütezeit: 5
Höhe: 4 Meter, langsam wachsend, aber starke Ausläuferbildung, wenn bodennah gemäht!
Bienenweide, Nahrung für Vögel, Wildbienen, Kleinsäuger



Gemeines Pfaffenhütchen
(*Euonymus europaeus*)

Standort: halbschattig, eher feucht
Blütezeit: 6-7
Höhe: bis 5 Meter, langsam wachsend
Nektarreiche Blüten, Nahrung für Vögel («Rotkehlchenbrot»)
Früchte giftig



Haselstrauch (*Corylus avellana*)

Standort: eher sonnig
Blütezeit: 2-4
Höhe: bis 5 Meter, schnellwüchsig, verdrängt andere Sträucher, kann auf den Stock gesetzt werden
Bienenweide, Nüsse sind Nahrung für Kleinsäuger und Vögel, Nüsse essbar



Gemeiner Schneeball
(*Viburnum opulus*)

Standort: halbschattig, mässig feucht
Blütezeit: 5-6
Höhe bis 4 Meter, eher schnellwüchsig
Nektarreiche Blüten, Beeren sind Nahrung für Vögel, für den Menschen ungeniessbar



Wolliger Schneeball
(*Viburnum lantana*)

Standort: sonnig - schattig, mässig trocken
Blütezeit: 5
Höhe: 4 Meter, eher schnellwüchsig
Nektarreiche Blüten, Beeren sind Nahrung für Vögel, für den Menschen ungeniessbar



Weissdorn (*Crataegus sp.*)

Standort: feucht, sonnig bis halbschattig
Blütezeit: 4-6
Höhe: 4 Meter, langsam wachsend
Bienenweide, Nahrung für Vögel und Raupen, ideales Gehölz für Brutvögel (Dornen), essbar
Achtung Feuerbrand! Nicht in der Nähe von Obstbäumen pflanzen



Schwarzer Holunder
(*Sambucus nigra*)

Standort: sonnig - schattig, frisch – feucht
Blütezeit: 5-6
Höhe: bis 7 Meter, schnellwüchsig
Bienenweide, wichtige Nahrung für Vögel
Früchte essbar



Roter Holunder
(*Sambucus racemosa*)

Standort: halbschattig, feucht, bei Trockenheit Gefahr von Mehltau
Blütezeit: 4-5
Höhe: bis 4 Meter, schnellwüchsig
Bienenweide, frühblühend
Nahrung für Vögel
Saft geniessbar, Kerne giftig



Feld-Ahorn (*Acer campestre*)

Standort: sonnig bis schattig
Blütezeit: 5
Höhe: bis 10 Meter, langsam wachsend, starker Stockausschlag
Bienenweide



Traubenkirsche (*Prunus padus*)

Standort: mässig feucht, sonnig
Blütezeit: 4-6
Höhe: bis 10 Meter, schnellwüchsig, starker Stockausschlag
Bienenweide und Vogelnahrung



Sal-Weide (*Salix caprea*)

Standort: mässig feucht
Blütezeit: 3-5,
Höhe: bis 9 Meter, schnellwüchsig
Wichtige Nahrung für Insekten (z.B. Schmetterlinge, deren Raupen, viele andere Insekten)

Weitere einheimische Weiden: Ohr-Weide (*Salix aurita*), Purpur-Weide (*Salix purpurea*), Lavendel-Weide (*Salix elaeagnos*), Korb-Weide (*Salix viminalis*), u.a.



Vogelbeerbaum
(*Sorbus aucuparia*)
Standort: mässig feucht
Blütezeit: 5-6
Höhe: bis 15 Meter schnellwüchsig
Bienenweide, wichtige Nahrung für Vögel und Kleinsäuger
Achtung Feuerbrand!



Elsbeerbaum
(*Sorbus torminalis*)
Standort: eher sonnig, erträgt Trockenheit gut,
Blütezeit: 5
Höhe: bis 15 Meter langsam wachsend
Raupenfutter
Achtung Feuerbrand!



Mehlbeerbaum (*Sorbus aria*)
Standort: eher sonnig, erträgt Wärme und Trockenheit gut
Blütezeit: 5
Höhe: Bis 15 Meter, langsam wachsend
Bienenweide und Vogelnahrung
Achtung Feuerbrand!



Hagebuche (*Carpinus betulus*)
Standort: erträgt Wärme gut
Blütezeit: 5
Höhe: 1-20 Meter, langsam wachsend, lässt sich gut in Form schneiden
Wenn Hecke genügend dicht und breit: Nistgehölz und Versteck für Vögel

Auch die **Rotbuche** (*Fagus sylvatica*) eignet sich gut für eine Schnitthecke



Eibe
(*Taxus baccata*)
Standort: halbschattig, eher feucht
Blütezeit: 3-4
Höhe: bis 20 Meter, langsam wachsend, lässt sich gut in Form schneiden.
Vogelnahrung
stark giftig

Viele Arten, die in der freien Natur eine stattliche Höhe erreichen, können als Schnitthecken verwendet werden (Buche, Eibe, u.a.). Weitere Infos siehe «Hecken im Siedlungsraum»

Bilder: Albert Wickart, Röbi Feller (schweizerflora.ch)